

广州贝达医学检验实验室



GUANGZHOU BEI DA MEDICAL LABORATORY



.....













贝达医药

更衣室

Changing Room



推

PUSH





阅片室

阅片室





0030室号

制片室

Production Room



推

PUSH



.....









.....



贝达德学

样本接收室

Specimen Receiving Room



.....



.....

贝达医学

样本库1

Temporary Storage for Sample 1



• • • • •



贝达医学
样本库2
Temporary Storeroom For Sample 2

防爆区域



推
PUSH



















1. 实验人员进入该室应在缓冲间穿好实验室专用工作服（蓝色）、实验中途戴一次性手套（先戴一副PVC手套，再戴一副乳胶手套），手套需常更换；
2. 记录数据需设计表格，记录数据时，应使用蓝色圆珠笔或黑色签字笔；
3. 样本的登记、保存、提取应按标准操作规程要求进行；
4. 使用本室专用的、经灭菌处理的加样器加样；
5. 实验记录使用本室专用的记录本和笔；
6. 使用过的离心管、瓶盖需用2000mg/L有效氯消毒液浸泡过夜后再灭菌；
7. 废弃的样本应按医疗垃圾处理；
8. PCR扩增后的产物不得带出本室；
9. 每天实验完毕，把所有物品整理整齐，工作台面先用1000mg/L次氯酸钠溶液擦拭，再用75%乙醇消毒，然后移动紫外灯消毒半小时（紫外灯照射台面60-90cm），
紫外灯消毒半小时（紫外灯照射台面60-90cm）。













.....





扩增室工作

1. 凡实验人员进入本室应在入口处(粉红色)处, 实验中须戴一次性手套。
2. 每次实验记录, 应使用本室。
3. 认真核对检验结果, 做好记录。
4. 发现室内质控品结果有问题, 并向技术负责人报告, 认真分析原因。
5. PCR扩增仪在每次使用前, 应先用酒精棉签清洁扩增孔, 同时用酒精棉签清洁扩增孔周围。
6. PCR扩增仪在每次使用前, 应先用1000mg/L次氯酸钠溶液擦拭, 然后用酒精棉签清洁扩增孔, 同时用酒精棉签清洁扩增孔周围。
7. 扩增室工作结束后, 把所有扩增孔先用1000mg/L次氯酸钠溶液擦拭, 然后用酒精棉签清洁扩增孔, 同时用酒精棉签清洁扩增孔周围。

(紫外灯照射台面60-90cm)。



.....











手套，手套更
的记录本和笔；
作好签名；
，则本次结果作
原因，作好详细
区；
内进行，减少气溶
有物品摆放整齐，
发溶液擦拭，再用
时桌面和仪器消毒半
(n)。



.....







.....

万达集团

储 存 室

WUHAN WANDA



• • • • •





贝达医学

污水处理间

Sewage Treatment Room



• • • • •



贝达医学

医废暂存间

Temporary Storeroom For Biohazard Waste



危险废物贮存场所

单位名称:

贝达(广州)生物科技有限公司

贮存场编号:

危-01

主要贮存种类:

化学废液、生物废弃物、实验废弃物、医疗废物

国家生态环境部监制



拉



